



Proteja a su niño de la varicela

La varicela es una enfermedad que puede ser grave para niños y adultos

Antes que tuviéramos la vacuna, 11 000 personas eran hospitalizadas y cerca de 100 morían a causa de la varicela cada año en los Estados Unidos.

La varicela se contagia fácilmente. Generalmente causa fiebre y un brote en la piel de la cabeza a los pies con ampollas que dan picazón y que se pueden infectar y dejar cicatrices. La varicela también puede causar neumonía, encefalitis (hinchazón del recubrimiento del cerebro) e infección en la sangre.

Se recomiendan dos dosis de la vacuna contra la varicela, la primera dosis al cumplir un año y la segunda de los 4 a los 6 años (antes de entrar al kínder).

Para entrar a la guardería infantil, preescolar o el kínder, usted debe llevar prueba de la vacuna de la varicela o un comprobante firmado por el doctor, de que su hijo ya tuvo la enfermedad.

Llame hoy a su doctor, enfermera, o clínica para recibir la vacuna contra la varicela.



Después de la vacuna

Los efectos secundarios más comunes de la vacuna contra la varicela son leves. Estos pueden incluir dolor y enrojecimiento donde se aplicó la vacuna y en algunas ocasiones fiebre ligera. Un brote leve puede aparecer alrededor del sitio de la inyección hasta un mes después de vacunado. Efectos secundarios más serios casi nunca ocurren.

¿Puede mi niño ser vacunado y todavía desarrollar la varicela?

Sí. Algunos niños vacunados todavía pueden desarrollar la varicela porque ninguna vacuna es 100% efectiva. Sin embargo tales casos son generalmente leves y presentan menos de 50 ampollas. Los niños vacunados son menos propensos a tener fiebre y tienden a recuperarse más rápidamente.

Niños no vacunados

Usted puede decidir que su hijo no cumpla el requerimiento de la vacuna contra la varicela para el cuidado infantil y la escuela. Su doctor necesitará firmar la forma de exención diciendo que usted recibió la información sobre beneficio y riesgo de las vacunas. Si se presentara un brote, su hijo estaría a riesgo de enfermarse y necesitaría quedarse en casa por varias semanas hasta que el brote termine.

Aprenda más

Visite la página web del Departamento de Salud:
www.doh.wa.gov

Para ayuda en encontrar una clínica de vacunación, llame a:



Family Health Hotline

1.800.322.2588

1.877.833.6399 (relevador tty)

programas de WithinReach

www.ParentHelp123.org



Washington State Department of

PUBLIC HEALTH
ALWAYS WORKING FOR A SAFER AND
HEALTHIER WASHINGTON

Financiado parcialmente por el Programa Federal de Vacunas para Niños. Si usted tiene una discapacidad y necesita este documento en otro formato, por favor llame al 1-800-322-2588 (711-TTY relevador). 325-0158S DOH 348-110SP April 2012